

Drug Safety Update Volume 7, Issue 6 January 2014

20 de enero 2014

Temas: Prasugrel, Ofatumumab, Temozolomida , Capecitabina

## Indice

### **Prasugrel ( Effient ) : aumento del riesgo de hemorragia informaci n sobre el horario adecuado de administraci n de la dosis de carga**

Se dispone de nueva informaci n proveniente de ensayos cl nicos sobre el momento apropiado para la dosis de carga de prasugrel cuando se utiliza en pacientes con angina inestable o sin elevaci n del segmento ST infarto de miocardio.

En estos pacientes, cuando la angiograf a coronaria se realiza dentro de las 48 horas despu s del ingreso , la dosis de carga s lo debe darse en el momento de la intervenci n coronaria percut nea.

### **Ofatumumab : tamizaje para el virus de la hepatitis B previo al tratamiento**

Todos los pacientes deben ser evaluados para la infecci n por virus de la hepatitis B antes de iniciar el tratamiento con ofatumumab . Los pacientes con infecci n activa por este virus no deben ser tratados con ofatumumab .

### **Temozolomida : riesgo de da o hep tico , incluyendo insuficiencia hep tica fatal. Actualizaci n de advertencias y orientaci n para seguimiento**

En pacientes tratados con temozolomida se han informado casos de da o hep tico , incluyendo insuficienica hep tica con desenlace fatal. Debe evaluarse la funci n hep tica antes y durante el tratamiento con temozolomida .

### **Capecitabina : riesgo de reacciones cut neas severas : suspender el tratamiento**

Durante el tratamiento con capecitabina se ha notificado la ocurrencia de reacciones cut neas graves como s ndrome de Stevens -Johnson y necr lisis epid rmica t xica. Algunos casos han sido mortales .

Enlace al N mero completo

<http://bit.ly/1cDu783>