ANMAT, Recomendaciones para los Profesionales

Administración de diacereina en el tratamiento de osteoartritis de cadera y rodilla

7 de Abril de 2014

La diacereina es un fármaco utilizado para el tratamiento de las manifestaciones funcionales de la artrosis y para aliviar el dolor articular.

Conforme a la evaluación de la evidencia médica disponible respecto al balance riesgo-beneficio de la administración de diacereina, y debido a los riesgos de diarrea severa y daños en el hígado, la ANMAT recomienda a los profesionales de la salud:

- Controlar de cerca la tolerancia del paciente al tratamiento durante las primeras 2 a 4 semanas de uso de la diacereina.
- Vigilar la aparición de signos y síntomas de alteración hepática.
- Suspender el tratamiento en el momento en que el paciente presente diarrea.
- Valorar en todos los casos el uso de otras alternativas terapéuticas.
- No se aconseja su administración en pacientes mayores de 65 años.
- No se aconseja su administración en pacientes con enfermedades intestinales previas.
- No debe administrarse a pacientes con enfermedad hepática.

Asimismo, la ANMAT recuerda a los profesionales de la salud que evalúen cuidadosamente el riesgo- beneficio del uso de la diacereina en pacientes que se encuentren simultáneamente

bajo trata miento quimioterápico o con antibióticos.