

## **Hacia una mejor atención a los pacientes : fármacos que deben evitarse en el 2014**

Prescrire International , 1 de junio 2014

### **resumen**

Las evaluaciones de Prescrire sobre el balance de riesgos y beneficios de los nuevos medicamentos y nuevas indicaciones se basan en un procedimiento riguroso que incluye una búsqueda sistemática y reproducible la literatura , la identificación de los resultados relevantes para los pacientes , la priorización de la evidencia justificativa , con base en la solidez de las pruebas, la comparación con tratamientos estándar y un análisis tanto de los efectos adversos conocidos, como los potenciales .

Nuestra revisión de 2014 se refiere a los medicamentos analizados en La Revue Prescrire durante un período de cuatro años, de 2010 a 2013. Se identificaron 68 medicamentos que son potencialmente más dañinos que beneficiosos en todas sus indicaciones autorizadas .

En la mayoría de los casos, están disponibles otros fármacos con un mejor balance de daños y beneficios. En otros casos , no hay ningún tratamiento alternativo satisfactorio. Sin embargo, incluso para enfermedades graves , esto no justifica exponer a los pacientes a riesgos graves cuando un medicamento tiene ninguna eficacia probada . Algunos medicamentos pueden ser usados dentro del contexto de los ensayos clínicos, ya que cuando los pacientes son incluidos en estos estudios se les informa que los daños y beneficios son inciertos y que por ello es precisamente qué se les pide que participen en la investigación clínica. Cuando no hay tratamientos disponibles que pueden mejorar el pronóstico , más allá del efecto placebo, la mejor opción es el tratamiento de soporte individualizado .

El original en inglés disponible en:

["Towards better patient care: drugs to avoid in 2014" Prescrire Int 2014; 23 \(150\): pp.161-165. \(Pdf, free\)](#)

Prescrire's assessments of the harm-benefit balance of medications.

Drugs to avoid, 2014. All for Alzheimer's disease. Donepezil, galantamine, rivastigmine, and memantine.

Medicamentos a no utilizar en 2014. Todos los del Alzheimer. Donepezil, galantamine, rivastigmine y memantine.

La mejor revista farmacoterapéutica del mundo.

Fármacos a evitar en 2014, tras valorar su balance daño beneficio. Prescrire International.

Gliptinas, Fibratos, Domperidona, Orlistat, Tacrolimus, COXIBs, Trimetazidina, Ivabradina, Denosumab, Glucosamina, Diacereina, Moxifloxacino, Telitromicin, Donepezil, galantamine y rivastigmine, Memantina, Bupropion, Vareniciclina...  
<http://goo.gl/wLK7TV>