

Duración del tratamiento adyuvante endocrino para mujeres con cáncer de mama y receptores hormonales positivos

J Clin Oncol, 27/05/2014

Propósito: Actualización de la Guía de práctica clínica de la ASCO sobre la duración óptima del tratamiento endocrino adyuvante en la base a los nuevos datos, sobre todo del tamoxifeno.

Métodos: El Comité de Actualización ASCO llevó a cabo una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorios desde enero 2009 a junio de 2013 y analizó tres ensayos históricos. Las recomendaciones de la Guía se basan en la revisión de la evidencia de la Actualización del Comité. Los resultados de interés fueron la supervivencia, la recurrencia de la enfermedad, y los eventos adversos.

Resultados: Esta actualización de la Guía refleja los datos emergentes sobre la duración del tratamiento con tamoxifeno. Ha habido cinco estudios de tratamiento con tamoxifeno con una duración mayor de 5 años. Los dos mayores estudios con mayor seguimiento informado muestran una ventaja en la supervivencia del cáncer de mama con una duración de 10 años de tratamiento con tamoxifeno. Además de las ganancias modestas en la supervivencia, el tratamiento prolongado con tamoxifeno durante 10 años, en comparación con 5 años, se asoció con un menor riesgo de recurrencia del cáncer de mama y con el cáncer de mama contralateral.

Recomendaciones: Las directrices ASCO anteriores recomendaban el tratamiento de las mujeres con cáncer de mama con receptores hormonales positivos y premenopáusicas durante 5 años de tamoxifeno, y las que son posmenopáusicas un mínimo de 5 años de terapia adyuvante con un inhibidor de la aromatasa o tamoxifeno seguido de un inhibidor de la aromatasa (en secuencia). A las mujeres pre o perimenopáusicas y que hayan recibido 5 años de tamoxifeno adyuvante, se les debe ofrecer 10 años de duración total de tamoxifeno. A las mujeres después de la menopausia y que hayan recibido 5 años de tamoxifeno adyuvante, se les debe ofrecer la opción de continuar con el tamoxifeno o cambiar a un inhibidor de la aromatasa durante 10 años de terapia total de endocrina adyuvante.

El trabajo

Burstein HJ1, Temin S2, Anderson H2, Buchholz TA2, Davidson NE2, Gelmon KE2, Giordano SH2, Hudis CA2, Rowden D2, Solky AJ2, Stearns V2, Winer EP2, Griggs JJ2.

Adjuvant Endocrine Therapy for Women With Hormone Receptor-Positive Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Focused Update.

J Clin Oncol. 2014 May 27. pii: JCO.2013.54.2258. [Epub ahead of print]

disponible en

<http://bit.ly/1kpxzGV>