

TRATAMIENTO DE LEPTOSPIROSIS

Edad	Antibiótico
Niños	Amoxicilina 50 mg/kg/día VO en cuatro dosis durante 5-7 días Penicilina procaínica 50.000-100.000 UI /Kg/día en cuatro dosis durante 5-7 días En alergia a penicilina eritromicina 30- 50 mg/kg /día VO en cuatro dosis durante 5-7 días
Mayores de 9 años	Doxicilina 100 mg VO c/12 hs durante 5-7 días Amoxicilina 500 mg VO c/8 hs durante 5-7 días- Ampicilina 500-750 mg c/6 hs En alergia a penicilina :eritromicina 30- 50 mg/kg /día VO en cuatro dosis durante 5-7 días
Embarazadas	Amoxicilina 500 mg c/8 hs durante 5-7 días En alergia a penicilina :eritromicina 500 mg VO c/6 hs durante 5-7 días
Todo paciente hospitalizado	Niños : Penicilina cristalina 50.000-100.000 UI / Kg/día c/ 6hs durante 7-10 días Ampicilina 50 mg /kg/día EV c/6hs durante 7-10 días Ceftriaxona 80-100 mg/kg/día EV c/12-24 hs durante 7-10 días cefotaxime 50-100 mg/kg/día EV c/ 6 hs durante 7-10 días Adultos: Ceftriaxona 1 gr/día EV durante 7-10 días Ampicilina 0,5-1 g EV c/ 6 hs durante 7-10 días Penicilina cristalina 1.5 M UI EV c/6 hs durante 7-10 días Cefotaxime 1 gr c/ 6 hs EV durante 7-10 días

IMPORTANTE: No administrar ácido acetil salicílico

QUIMIOPROFILAXIS DE LEPTOSPIROSIS

Se indicará a todos aquellos contactos de un caso sospechoso, que hayan estado expuestos al mismo riesgo.

Doxiciclina: Semanalmente mientras permanezca en condiciones de riesgo

Dosis: Niños de 9 a 12 años: 100 mg semanal

Mayores de 12 años: 200 mg semanal

Contraindicaciones: Embarazadas y menores de 9 años

Amoxicilina: Durante 3 días

Dosis: 500 mg cada 8 hs