

Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina 2007

EDAD	BCG	Anti-hepatitis B	Cuádruple	Sabin	Triple viral	Anti-hepatitis A	Triple bacteriana	Doble bacteriana	Doble viral
		(HB)	(DTP-Hib)	(OPV)	(SRP)	(HA)	(DTP)	(dT)	(SR)
Recién nacido	UNICA dosis*	1 ^{ra} dosis +							
2 meses		2 ^{da} dosis	1 ^{ra} dosis	1 ^{ra} dosis					
4 meses			2 ^{da} dosis	2 ^{da} dosis					
6 meses		3 ^{ra} dosis	3 ^{ra} dosis	3 ^{ra} dosis					
12 meses					1 ^{ra} dosis	1 dosis			
18 meses			4 ^{ta} dosis	4 ^{ta} dosis					
6 años				Refuerzo	2 ^{da} dosis		Refuerzo		
11 años		Iniciar o completar esquema (3 dosis)&			Refuerzo@				
16 años								Refuerzo	
Cada								Refuerzo	

10 años									
Puerperio o post- aborto inmediato									1 dosis@

* **BCG:** antes de egresar de la maternidad

+ **Antihepatitis B:** en las primeras 12 horas de vida

El recién nacido prematuro con peso menor a 2000 g. debe recibir la dosis neonatal (dentro de las 12 hs de vida) y 3 dosis más: a los 2, 4 y 6 meses.

& **Si no recibió el esquema en la infancia, se aplicará 1ra. dosis, 2da. dosis al mes de la primera y la 3ra. dosis a los 6 meses de la primera.**

@ **Si no recibió previamente, dos dosis de triple viral o bien 1 dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral**

Embarazadas: aplicar vacuna dT a partir del 2º trimestre de embarazo; 1º, 2º dosis o refuerzo según corresponda y luego cada 10 años.

BCG: Tuberculosis

HA: Hepatitis A

HB: Hepatitis B

DTP-Hib (Cuádruple): difteria, tétanos, pertussis, *Haemophilus influenzae* b

OPV (Sabin): vacuna poliomielítica oral

DTP (Triple bacteriana): difteria, tétanos, pertussis

SRP (Triple viral): sarampión, rubéola, parotiditis

SR (Doble viral): sarampión, rubéola

dT (Doble bacteriana): difteria, tétanos