


EUM: INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS OTORGADA A PACIENTES EN LA CONSULTA AMBULATORIA LATINOAMERICANA

La Plata, 2 de Octubre 2006



Centro de
FARMACOEPIDEMIOLOGIA
y Uso Racional de Medicamentos
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNC





La ***Guía de la Buena Prescripción*** señala que el prescriptor, luego de seleccionar el medicamento apropiado, debe redactar la prescripción, dar información, instrucciones y advertencias al paciente, como así también supervisar y/o detener el tratamiento.



FUNDAMENTOS

- La prescripción racional se consigue cuando el profesional bien informado selecciona el medicamento correcto, en la dosis adecuada, durante el período de tiempo apropiado y al menor coste posible.
- Según informes de la OMS el 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan y comercializan en forma inadecuada en todo el mundo.
- Los malos hábitos de prescripción originan tratamientos inefectivos e inseguros, exacerbación o alargamiento de la enfermedad, tensión y daño al paciente y costos más altos.
- Los malos entendidos en la comunicación médico-paciente pueden ser una causa de fallo en el tratamiento, de reacciones adversas o de falta de adherencia al tratamiento.

OMS: "Uso Racional de Medicamentos". Conferencia de Expertos de Nairobi. Zambia. 1985

Organización Mundial de la Salud: Promoción del uso racional de medicamentos: componentes actuales. Perspectivas políticas sobre medicamentos de la OMS, 2002.

Arnao JM, Laporte JR: "Promoción del uso racional de medicamentos y preparación de guías farmacológicas" en *Principios de epidemiología del medicamento*.

Britten N, et. al.: "Misunderstandings in prescribing decisions in general practice: qualitative study". *BMJ*. 2000;320:484.

OBJETIVOS

Conocer cuáles son los errores médicos más frecuentes en:

- la redacción de la receta
- las instrucciones y advertencias
- y el seguimiento del tratamiento.

Determinar si los medicamentos prescritos guardan relación con el diagnóstico

Evaluar la relación entre duración de la consulta e información del paciente

DISEÑO Y MÉTODO

Diseño metodológico:

Estudio observacional multicéntrico de tipo transversal

Población de estudio:

Criterios de inclusión:

Todo paciente que reciba una prescripción en una consulta ambulatoria y que desee participar de la encuesta.

Criterios de exclusión:

Todo paciente que no posea la prescripción al momento de la encuesta y/o no desee participar del estudio.

Países y Participantes

- **Argentina**
- Aguirre, Jorge
- Amicarelli, Yamila
- Bejarano, Ana
- Beltramone, Marina
- Calderon, Claudia
- Cecchetto, Eugenio
- Feliza, Guido
- Fontana, Marcela
- Garcia, Adelaida
- Gonzalez, Marcos
- Kerman, Javier
- López, Ana Cristina
- Milone, María Caterina
- Olguin, Mariel
- Plaza, María de la Cruz
- Roitter, Claudia
- Salica, Juan Pablo
- Spessot, Dardo
- Unias, Lucia
- Valsecia, Mabel
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba

- **Colombia:**
- Avila De la Hoz, Ricardo
- Hernández, Orison
- Otero, Janelly
- Pardo Segrera, Luis

- **Costa Rica:**
- Chaves, Albin
- Jimenez H, Guillermo

- **Cuba:**
- Rodriguez, Adalis
- Yerra, Issis

- **Chile:**
- Muñoz Torres, Gloria
- Chessarina, Tuchie

- **Ecuador:**
- Maldonado, Juan Carlos
- Santos, Federico
- Tarapues, Mónica

- **Guatemala:**
- Izaguirre, Elionora
- Del Valle, José Maria
- Lara-Way, Ana Silvia
- Moran Gomez, Maria Esther
- Ramirez, Sheila
- Romero Trujillo, Mircea Lisbeth

- **Nicaragua:**
- Narváes, Edgard

- **Panamá:**
- Serrano, Victor

- **Uruguay:**
- Goyret, Alejandro
- Lucero, María Laura
- Mullin, Cristina
- Nanni, Luciana
- Noceti, Ofelia
- Ravera, Elizabeth

Países y Participantes

Países participantes	Número de pacientes	Porcentajes
Argentina	1925	37.9 %
Colombia	395	7.8 %
Costa Rica	500	9.8 %
Cuba	361	7.1 %
Chile	300	5.9 %
Ecuador	552	10.8 %
Guatemala	457	9 %
Nicaragua	200	4 %
Panamá	75	1.5 %
Uruguay	314	6.2 %
TOTAL	5079	100 %

TOTAL DE DATOS

ROCESADOS A LA FECHA:

4030

79.3%

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: datos parciales

Centro:	Provincia:		País:		
Encuesta al paciente <i>(marque con una cruz)</i>					
Sexo	41%	Masc.	59%	Fem.	Edad (en años o meses):
Lugar donde se realizó la consulta <i>(marque con una cruz)</i>					
Servicio de emergencia o guardia		Público		Privado	
Dispensario o centro de salud	31%	Público		Privado	
Consultorio externo de un hospital	38%	Público		Privado	
¿Cuánto duró la consulta?		< 10'	49%	10-20'	>20'
¿Es la 1º vez que consume este fármaco?	52%	Si		No	Tiene enfermedad de base (cuál?):
¿UD sabe leer?	89%	Si		No	
Información recibida sobre el problema de salud actual					
¿Conoce el diagnóstico?		Si		No	¿Cuál es?
¿Conoce el objetivo de este tratamiento?		Si		No	¿Cuál es?



INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: datos parciales

Información recibida sobre el problema de salud actual				
¿Conoce el diagnóstico?	88%	Si	No	¿Cuál es?
¿Conoce el objetivo de este tratamiento?	70%	Si	No	¿Cuál es?
Información recibida sobre el fármaco				
¿Conoce el efecto?	53%	Si	No	
¿Sabe la duración del tratamiento?	70%	Si	No	Cuánto (días o meses)
¿Le explicaron qué sucede si no lo toma?	43%	Si	No	
Información recibida sobre las Reacciones adversas (RAM)				
¿Conoce las RAM que puede tener?	14%	Si	No	Nombre 2 (dos)
Información recibida sobre las instrucciones				
¿El médico corroboró si Ud. comprendió?	67%	Si	No	
¿Sabe cuándo es la próxima visita?	70%	Si	No	



INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: datos parciales

Información escrita en la prescripción médica (receta)				
¿Están los datos personales del paciente?	Si	No		
¿Están los datos personales del médico?	Si	No	Masculino	Femenino
¿Fue prescripto por marca?	Si	No		
¿Fue prescripto por nombre genérico?	Si	No	Cuál ?	
¿Está escrita la forma farmacéutica?	Si	No		
¿Está escrita la dosis?	Si	No	¿Cuál es?	
¿Está escrito el intervalo de dosis?	Si	No	¿Cuál es?	

Análisis de Subgrupo: *los que conocen las RAM*

Centro:	Provincia:		País:		
Encuesta al paciente <i>(marque con una cruz)</i>					
Sexo	41%	Masc.	59%	Fem.	Edad (en años o meses):
Lugar donde se realizó la consulta <i>(marque con una cruz)</i>					
Servicio de emergencia o guardia		Público		Privado	
Dispensario o centro de salud	31%	Público		Privado	
Consultorio externo de un hospital	38%	Público		Privado	
¿Cuánto duró la consulta?		< 10'	49%	10-20'	>20'
¿Es la 1º vez que consume este fármaco?	52%	Si		No	Tiene enfermedad asociada (cuál?):
¿UD sabe leer?	89%	93%		No	51% 58%
Información recibida sobre el problema de salud actual					
¿Conoce el diagnóstico?		Si		No	¿Cuál es?
¿Conoce el objetivo de este tratamiento?		Si		No	¿Cuál es?



Análisis de Subgrupo: *los que conocen las RAM*

Información recibida sobre el problema de salud actual				
¿Conoce el diagnóstico?	88%		No	¿Cuál es?
¿Conoce el objetivo de este tratamiento?	70%	81%	No	¿Cuál es?
Información recibida sobre el fármaco				
¿Conoce el efecto?	53%		No	
¿Sabe la duración del tratamiento?	70%	81%	No	Cuánto (días o meses)
¿Le explicaron qué sucede si no lo toma?	43%	66%	No	
Información recibida sobre las Reacciones adversas (RAM)				
¿Conoce las RAM que puede tener?		Si	No	Nombre 2 (dos)
Información recibida sobre las instrucciones				
¿El médico corroboró si Ud. comprendió?	67%	85%	No	
¿Sabe cuándo es la próxima visita?	70%	81%	No	





Análisis de Subgrupo: *los que conocen las RAM*

Información escrita en la prescripción médica (receta)				
¿Están los datos personales del paciente?	Si	No		
¿Están los datos personales del médico?	Si	No	Masc	Femenino
¿Fue prescripto por marca?	Si	No		
¿Fue prescripto por nombre genérico?	Si	No		Cuál ?
¿Está escrita la forma farmacéutica?	Si	No		
¿Está escrita la dosis?	Si	No		¿Cuál es?
¿Está escrito el intervalo de dosis?	Si	No		¿Cuál es?



“Mil Ideas”, Ipanema, 2003



“Farmacoepidemiología y Globalización”
Dr. Albert Figueras - Instituto Catalán de Farmacología



Propuestas...

Sugerencias....

Comentarios....



Muchas gracias por participar !!!

- **Argentina**
- Aguirre, Jorge
- Amicarelli, Yamila
- Bejarano, Ana
- Beltramone, Marina
- Calderon, Claudia
- Cecchetto, Eugenio
- Feliza, Guido
- Fontana, Marcela
- Garcia, Adelaida
- Gonzalez, Marcos
- Kerman, Javier
- López, Ana Cristina
- Milone, María Caterina
- Olguin, Mariel
- Plaza, María de la Cruz
- Roitter, Claudia
- Salica, Juan Pablo
- Spessot, Dardo
- Unias, Lucia
- Valsecia, Mabel
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba

- **Colombia:**
- Avila De la Hoz, Ricardo
- Hernández, Orison
- Otero, Janelly
- Pardo Segrera, Luis

- **Ecuador:**
- Maldonado, Juan Carlos
- Santos, Federico
- Tarapues, Mónica

- **Panamá:**
- Serrano, Victor

- **Costa Rica:**
- Chaves, Albin
- Jimenez H, Guillermo

- **Guatemala:**
- Izaguirre, Elionora
- Del Valle, José Maria
- Lara-Way, Ana Silvia
- Moran Gomez, Maria Esther
- Ramirez, Sheila
- Romero Trujillo, Mircea Lisbeth

- **Uruguay:**
- Goyret, Alejandro
- Lucero, María Laura
- Mullin, Cristina
- Nanni, Luciana
- Noceti, Ofelia
- Ravera, Elizabeth

- **Cuba:**
- Rodriguez, Adalis
- Yerra, Issis

- **Chile:**
- Muñoz Torres, Gloria
- Chessarina, Tuchia

- **Nicaragua:**
- Narváes, Edgard